



William Randolph Hearst Burn Center

Aplicación de Silvadene, Thermazine (sulfadiazina) (SSD)

¿Para qué sirve Silvadene?

Silvadene se aplica en las quemaduras no cicatrizadas para evitar que se infecten. También proporciona un ambiente húmedo mientras la quemadura cicatriza. El médico prescribirá Silvadene en crema ya sea en el hospital o en la clínica de quemados. La prescripción puede abastecerse en cualquier farmacia.

¿Con qué frecuencia lo uso?

Silvadene debe aplicarse 2 veces al día, salvo que el médico le dé otras indicaciones.

¿Deben tomarse precauciones especiales?

- Antes de usar esta crema, debe decirle al médico si alguna vez ha tenido una reacción alérgica a cualquier medicamento con "sulfa" o si está embarazada.
- Silvadene nunca debe aplicarse en el rostro. Se puede aplicar en las orejas.
- No suspenda el uso de Silvadene hasta que el médico así se lo indique.
- Si la crema se oscurece, deséchela y obtenga un envase nuevo.

¿Cómo cambio el vendaje?

Equipo necesario:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Vendaje Adaptic o Telfa• Gasa Kerlix | <ul style="list-style-type: none">• Bajalengua• Silvadene |
|---|--|
1. Si el médico le recetó un medicamento para el dolor, tómelo media hora antes de cambiarse el vendaje.
 2. Quite el vendaje viejo y deséchelo.
 3. Lávese las manos.
 4. En la ducha o la bañera, lávese la quemadura con una toalla pequeña limpia y un jabón suave, como por ejemplo Dove® o Ivory®.

5. Después de lavarse la quemadura, séquela dándose palmaditas suaves con un paño o una toalla limpia.
6. Fíjese en la herida. Si nota alguno de estos síntomas, llame al Centro de Quemados o Clínica de Quemados:
 - Más de una pulgada de enrojecimiento alrededor de la quemadura.
 - Más inflamación que el día anterior. (Recuerde que es normal que la quemadura esté hinchada durante 3 a 5 días después de ocurrir.)
 - La piel que rodea la quemadura se siente caliente al tacto.
 - Fiebre (temperatura de 102 grados F o más alta).
 - Secreción de color verde y con mal olor.
7. Abra el empaque del vendaje (Adaptic® o Telfa®).
8. Abra el tarro de Silvadene®. Con un bajalengua, saque la cantidad de crema que necesitará para cubrir la herida por completo. Coloque la crema dentro del empaque del vendaje. Cierre el tarro de Silvadene®.
9. Con un bajalengua, aplique una capa delgada (aproximadamente 1/8 a 1/16 de pulgada) de crema para cubrir todas las áreas quemadas.
10. Coloque una almohadilla no adhesiva (Telfa® o Adaptic®) sobre la crema. Envuelva el área quemada con gasa Kerlix®.

RECORDATORIOS IMPORTANTES:

- **Si la quemadura es en un brazo o pierna, eleve el brazo o la pierna sobre almohadas.**
- **Para prevenir la inflamación, envuelva el pie o pierna de la quemadura con una venda Ace al estar de pie o al caminar.**

Si tiene preguntas, llame al **CENTRO DE QUEMADOS** al:

(212) 746-5317 (las 24 horas del día)

o

(212) 746-5024 (lunes a viernes, 9 A.M. a 5 P.M.)

Esta información es breve y general. No debe tomarla como su única fuente de información sobre este tema de cuidado de la salud. No debe ser la base de ningún diagnóstico ni tratamiento. No sustituye las instrucciones de su médico. Hable con sus proveedores de atención médica antes de tomar una decisión sobre el cuidado de la salud.